

**Phụ lục 2:**



## **HƯỚNG DẪN BÀ MẸ KHI CHO CON ĐI TIÊM CHỦNG**

**Các bà mẹ khi cho con đi tiêm chủng cần phối hợp với cán bộ y tế để đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ.**

Chỉ định thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của con: như trẻ đang bị ốm, đang dùng thuốc, tiền sử dị ứng đặc biệt có **phản ứng mạnh với lần tiêm chủng trước**: sốt cao, quấy khóc kéo dài, phát ban, sưng nề vùng tiêm ... cho cán bộ Y tế.

Sau tiêm chủng cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng 30 phút để theo dõi và kịp thời xử trí nếu có những phản ứng bất thường xảy ra.

**Tiếp tục theo dõi trẻ thường xuyên tại nhà trong vòng 1- 2 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: tinh thần; bú mẹ; ăn; ngủ; thở; nhiệt độ; phát ban; phản ứng sưng đau tại chỗ tiêm... để có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe.**

Nếu trẻ sốt, cần cặp nhiệt độ và theo dõi hàng giờ, dùng thuốc hạ sốt cho trẻ theo sự chỉ dẫn của cán bộ Y tế. Không đắp bất cứ thứ gì lên vị trí tiêm.

### **TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ TRẺ MỘT MÌNH KẼ CẢ KHI NGỦ.**

**Đưa NGAY** trẻ tới bệnh viện hoặc các cơ sở Y tế gần nhất nếu trẻ có các dấu hiệu như: *sốt cao ( $\geq 39^{\circ}\text{C}$ , co giật, khóc thét, tím tái, khó thở, li bì (ngủ nhiều hơn bình thường), mệt lả, bú kém, bỏ bú, phát ban,...* hoặc khi phản ứng kéo dài trên 1 ngày.

Nếu cha mẹ không yên tâm về sức khỏe của trẻ hãy đến gặp hoặc gọi điện cho cán bộ Y tế để được tư vấn.

Số điện thoại:.....(Bác sĩ trạm Y tế)